

**Evitar herido se DESANGRE**

- **SÍNTOMAS:**
  - **Pérdida de sangre.**
  - **Rostro pálido.**
  - **Más peligroso si sangre roja y brillante.**
- **PRIMEROS AUXILIOS:**
  - **No tocar.**
  - **Comprimir** con tapón de lienzo o toalla.
  - **No torniquete** si no se sabe.

**Grandes QUEMADURAS**

- **PRIMEROS AUXILIOS:**
  - **Cubrir** las superficies quemadas con paño seco.
  - **Dar líquido** al paciente pero **NO** si esta en estado de conmoción o vomita.

**Prevenir SHOCK**

- **SINTOMAS:**
  - **Piel pálida, fría y húmeda.**
  - **Pulso rápido.**
  - **Sudor frío.**
  - **Desmayo o amodorramiento.**
- **PRIMEROS AUXILIOS:**
  - **Acostar** al paciente y envolver en cualquier cosa que le caliente.
  - **Poner la cabeza** al mismo nivel o más baja que el cuerpo.

**Prevenir la ASFIXIA**

- **SÍNTOMAS :**
  - **Labios y dedos azules.**
  - **Tos y dificultad respiratoria**
- **PRIMEROS AUXILIOS:**
  - **Eliminar la causa.** Si gas, ventilar espacio o sacar al exterior. Si objeto, procurar eliminar lo que se pueda extraer con los dedos.

**Como tratar las FRACTURAS**

- **SÍNTOMAS:**
  - **Miembros en posiciones anormales.**
  - **Huesos al descubierto.**
  - **Abultamientos en la piel**
- **PRIMEROS AUXILIOS:**
  - **Evitar tocar.** A no ser que sea victima de fractura de cuello o columna vertebral para evitar asfixia.
  - **Proceder con máximo cuidado.**

**Mover** a herido sin saber la lesión  
**Tocar** a electrocutado que este en contacto con  
**Tocar o hurgar** heridas

**Despegar** los restos de tejido pegados a quemadura  
**Abrir** ampollas

## **NO HACER**

**Dar alimento** o líquidos a inconscientes o heridos de vientre

**Poner** almohadas, levantar cabeza o incorporar si sufren desvanecimiento